



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
COMUNA HÂRSENI

Str. Principală, nr. 175, Tel. : (004) 0268/247800 ; fax : 0268/247832 cod fiscal 4384591,
e-mail: comunaharseni@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Hârseni

PRIMARUL COMUNEI Hârseni , JUDEȚUL BRASOV

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 2101 din 8. 04.2019 a primarului comunei Hârseni privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Hârseni

Reținând prevederile:

- art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

- HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

În temeiul prevederilor dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), precum și art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


PROPUNE:

Art.1.- Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile din proprietatea privată a comunei Hârseni, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește Compartimentul Agricol, Topografie, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hârseni.

Art. 3.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanța de contencios administrativ în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

INITIATOR
Primar-**OLTEAN Mihai**



JUD. BRAȘOV
COMUNA HÂRSENI
NR. 1761 DIN 27.03.2019.

S.C. CEMBRA FOREST S.R.L.
BRAȘOV

EXTRAS din
AMENAJAMENTUL PASTORAL
AL COMUNEI HÂRSENI ȘI COMUNEI POLITICE
MĂRGINENI

JUD. BRAȘOV



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201

202

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300


2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Denumirea trupurilor de pășune care fac obiectul prezentului studiu

Trupurile de pășune care alcătuiesc prezentul studiu sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 2.1

Nr.	Trupul de pășune		Parcele	Suprafața	Suprafața	
	Denumire	ha		ha	%	
0	1	2	3	4	5	
1	Dumbrava	1	28,68	65,24	4	
		2	26,56			
		3	10,00			
2	La Țarină	4	9,00	33,88	2	
		5	5,58			
		6	18,16			
		7	1,14			
3	Poiana Mare	8	2,92	192,35	13	
		9	29,16			
		10 A	76,57			
		10 B	1,88			
		10 C	12,38			
		10 N	0,27			
		11	50,92			
4	Zmida	13 A	20,50	28,65	2	
		13 B	8,15			
5	Chiciura	14	2,67	2,67	-	
6	Măloasa	15	23,60	28,39	2	
		16	4,79			
7	Pârâul Izvor	17	12,74	12,74	1	
8	Pârâul Dracului	18	13,71	13,71	1	
9	Bordee	19	20,75	20,75	1	
10	Măliniș	20 A	53,16	162,29	11	
		20 B	10,84			
		21 A	94,32			
		21 B	3,97			
11	Chiscuri	22	36,63	164,76	11	
		23 A	84,06			
		23 B	11,83			
		24	32,24			
12	Câmpul Mare	25	19,94	19,94	1	
13	Dealul Sineștilor	26	63,24	101,92	7	
		27	28,30			
		28	10,38			
14	Pietriceaua Copăcelului	29	16,08	16,08	1	
15	Scoarța	30	81,04	81,04	5	
16	Pățele	31	60,19	60,19	4	
17	Buzduganul	32 A	63,26	187,70	12	
		32 B	30,07			
		33	27,16			
		34 A	20,36			
		34 B	46,85			



Trupul de pășune		Parcele	Suprafața	Suprafața	
Nr.	Denumire		ha	ha	%
0	1.	2	3	4	5
18	Comisul	35 A	35,34	159,23	10
		35 B	38,94		
		36	18,29		
		37 A	43,86		
		37 B	17,13		
		38	5,67		
19	Văcăria Mare	39	30,47	30,47	2
20	Groapele	40 A	2,33	12,23	1
		40 B	1,37		
		41	2,96		
		42	5,57		
Total Comuna Hârseni			1394,23	1394,23	91
21	Țiganul	101 A	65,13	137,80	9
		101 B	32,06		
		102 A	3,93		
		102 B	7,39		
		103 A	21,17		
		103 B	8,12		
Total Comuna Politică Mărgineni			137,80	137,80	9
TOTAL GENERAL			1532,03	1532,03	100



Durata și perioada sezonului de pășunat pentru fiecare trup de pășune

Tabel nr. 5.4.1.2

Trup de pășune	Suprafața (ha)	u.a.	Interval de altitudine, (m)	Durata sezonului de pășunat (zile)	Perioada sezonului de pășunat
Dumbrava	65,24	1-3	495 - 510 m	175	mai - octombrie
La Tarină	33,88	4-7	560 - 580 m		
Poiana Mare	192,08	8-9, 10 ABC, 11-12	585 - 670 m	160	
Zmida	28,65	13	640 - 780 m		
Chiciura	2,67	14	730 - 800 m		
Mălcasa	28,39	15-16	620 - 725 m		
Pârâul Izvor	12,74	17	620 - 670 m		
Pârâul Dracului	13,71	18	590 - 630 m		
Bordee	20,75	19	595 - 625 m	175	
Măliniș	162,29	20-21	540 - 595 m		
Chiscuri	164,76	22-24	550 - 645 m		
Câmpul Mare	19,94	25	545 m		
Dealul Sineștilor	101,92	26-28	550 - 630 m	100	iunie - august
Pietriceaia Copăcelului	16,08	29	1450 - 1590 m		
Scoarța	81,04	30	1590 - 1975 m	70	
Pătele	60,19	31	1470 - 2180 m		
Buzduganul	187,70	32-34	1670 - 2285 m		
Comisul	159,23	35-38	1510 - 2175 m	55 - 70	
Văcăria Mare	30,47	39	1860 - 2175 m		
Groapele	12,23	40-42	1400 - 1710 m	100	
Țiganul	137,80	101-103	1350 - 2180 m	70	
TOTAL	1531,76	-	-	-	

5.4.4 Capacitatea de pășunat

Capacitatea de pășunat exprimă posibilitățile pe care le poate asigura o pășune pentru întreținerea animalelor în condiții de pășunat.

Coeficientul de transformare a diferitelor specii și categorii de animale în UVM:

Specificare	Coeficient de transformare în UVM	Nr. capete pentru 1 UVM
Tauri și boi de muncă	1,0-1,2	0,8-1,0
Vaci de lapte	1,0	1,0
Bovine de toate vârstele (în medie)	0,7-0,8	1,3-1,4
Tineret bovin peste 1 an	0,5-0,7	1,4-2,0
Tineret bovin sub 1 an	0,2-0,3	3,3-5,0
Oi și capre de toate vârstele	0,14	7,1
Oi și capre mature	0,15-0,16	6,3-6,7
Cai de toate vârstele	0,8	1,3
Cai de tracțiune	1,0-1,1	0,9-1,0
Tineret cabalin peste 1 an	0,5-0,7	1,4-2,0
Tineret cabalin sub 1 an	0,2-0,3	3,3-5,0

Capacitatea de pășunat se exprimă prin numărul de animale (în unități convenționale sau concrete) care pot să-și asigure nutrețul verde pe pășunea respectivă, în tot decursul sezonului de pășunat (Tabel nr. 5.4.4.1). La acestea mai

trebuie să se aibă în vedere evitarea pierderilor sau pășunatul excesiv și obținerea unui randament cât mai mare la animale.

La baza determinării capacității de pășunat au stat normele actuale de furajare a animalelor și s-a determinat cu relația (1) :

$$C_p(\text{UVM/ha}) = \frac{Pt(\text{kg/ha}) \cdot Cf\%}{Nz \cdot \text{DZP} \cdot 100} \cdot 100 \quad (1)$$

unde :

Pt – producția totală de iarbă;

Nz – necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal, în kg/zi;

DZP – numărul zilelor sezonului de pășunat;

Cf – coeficient de folosire a pajiștii, în %;

$$Cf = \frac{Pt(\text{kg/ha}) - Rn(\text{kg/ha})}{Pt(\text{kg/ha})} \cdot 100 \quad (2)$$

Rn – resturi neconsumate.

Necesarul zilnic de iarbă pentru diferite specii și categorii de animale este în general de:

- ✓ 40 - 50 kg la vacile cu producție mare, tauri și boi;
- ✓ 30 - 40 kg la vacile slab productive sau sterpe și cai adulți;
- ✓ 20 - 30 kg la tineretul bovin sub 200 kg;
- ✓ 5 - 6 kg la ovinele adulte și altele.

Coeficientul de folosire a pășunilor prin pășcut cu animale este în funcție de calitatea covorului ierbos și variază în limite destul de largi:

- ✓ 25 - 35 % pășuni pe terenuri umede cu rogozuri (*Carex sp.*);
- ✓ 30 - 50 % pășuni subalpine și montane de țepoșică (*Nardus stricta*);
- ✓ 45 - 70 % pășuni de câmpie și dealuri uscate (*Festuca valesiaca*, *F. rupicola*, *Botriochloa ischaemum*);
- ✓ 65 - 90 % pășuni de dealuri umede și lunci cu graminee valoroase;
- ✓ 85 - 95 % pășuni naturale montane cu graminee valoroase sau pășuni semănate din toate zonele.

Repartiția producției de iarbă într-o perioadă de pășunat este destul de neuniformă fiind mai mare la începutul spre mijlocul sezonului și mai mică la sfârșitul sezonului de pășunat.

Stabilirea încărcării cu animale a unei pășuni se face în baza determinării repetate în mai mulți ani a producției pășunii prin cosire, respectiv a producției totale de iarbă (Pt) pe cicluri de pășunat cât și stabilirea coeficientului de folosire a ierbii (Cf).

*- ZAF – număr de zile animal furajat pe pășune

DSP – durata sezonului de pășunat

0,05 – cantitatea de masă verde, în tone, consumată efectiv de un UVM/zi

Tabel nr. 5.4.4.1

Trupul de pășune		Parcele	Suprafața ha	Producția de masă verde	Coeficient de folosire	Producția de masă verde utilă	Producția totală de masă verde	ZAF	Încărcarea cu animale	
Nr.	Deumire			t/ha		t/ha	Total		OVM /ha	Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dumbrava	1 – 3	65,24	8,3	80	6,6	541,5	132,8	0,8	49,5
2.	La Țarină	4 – 7	33,88	8,3	80	6,6	281,2	132,8	0,8	25,7
3.	Poiana Mare	8 – 9, 10 ABC, 11 – 12	192,08	8,2	80	6,6	1575,1	131,2	0,8	157,5
4.	Zmida	13	28,65	7,8	75	5,8	223,5	117,0	0,7	21,0
5.	Chiciura	14	2,67	8,0	80	6,4	21,4	128,0	0,8	2,1
6.	Măloasa	15 – 16	28,39	7,9	75	5,9	224,3	118,5	0,7	21,0
7.	Pârâul Izvor	17	12,74	7,7	75	5,78	98,1	115,5	0,7	9,2
8.	Pârâul Dracului	18	13,71	7,2	75	5,4	98,7	108,0	0,7	9,3
9.	Bordee	19	20,75	8,2	80	6,6	170,2	131,2	0,8	17,0
10.	Măliniș	20 – 21	162,29	8,3	80	6,6	1347,0	132,8	0,8	123,2
11.	Chiscuri	22 – 24	164,76	8,3	80	6,6	1367,5	132,8	0,8	125,0
12.	Câmpul Mare	25	19,94	7,8	75	5,8	155,5	117,0	0,7	13,3
13.	Dealul Sineștilor	26 – 28	101,92	7,9	75	5,9	805,2	118,5	0,7	69,0
14.	Pietriceaua Copăcelului	29	16,08	4,6	60	2,8	74,0	55,2	0,6	8,9
15.	Scoarța	30	81,04	2,6	60	1,6	210,7	31,2	0,4	36,1
16.	Pâtele	31	60,19	2,3	60	1,4	138,4	27,6	0,4	23,7
17.	Buzduganul	32 – 34	187,70	2,5	55	1,4	469,3	27,5	0,4	73,7
18.	Comisul	35 – 38	159,23	2,2	50	1,1	350,3	22,0	0,3	50,0
19.	Văcăria Mare	39	30,47	2,5	50	1,3	76,2	25,0	0,4	11,7
20.	Groapele	40 – 42	12,23	2,5	50	1,3	30,6	25,0	0,3	3,1
21.	Țiganul	101 – 103	137,80	2,2	50	1,1	303,2	22,0	0,3	43,3
TOTAL			1531,76	6,7	-	4,7	8561,6	-	0,7	893,4

EVIDENȚA LUCRĂRILOR PROPUSE

Tabel nr. 6.1.

Lucrări propuse: ha	u.a	Suprafața (ha)	Combaterea eroziunii de adâncime și alunecări (ha)	Combaterea eroziunii de suprafață a solului (ha)	Tăieri de reducere a consistenței** (ha)	Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase** (ha)	Combaterea ferigi mai din pași** (ha/an)	Combaterea altor buruieni** (ha/an)	Distrugea mușuroșilor, nivelarea și curățirea pașilor** (ha)	Îndepărtarea materialului lemnos a clozelor și pietrelor** (ha)	Tăierea pașilor cu animale*** (ha/an)
	1	28,68				1,43		2,29	28,68		0,80
Dumbrava	2	26,56						2,12	26,56		0,74
	3	10,00				0,50		0,70	10,00		0,28
La Tarină	4	9,00				0,45		0,54	9,00		0,25
	5	5,58				0,28		0,28	5,58		0,16
	6	18,16				0,91		1,09	18,16		0,51
	7	1,14				0,06		0,07	1,14		0,03
	8	2,92				1,17		0,23	2,92	1,17	0,07
	9	29,16				2,33		2,04	29,16	2,33	0,75
Poiana Mare	10 A	76,57				7,66		4,59	76,57		1,96
	10 B	1,88				0,66		0,13	1,88	0,66	0,05
	10 C	12,38			12,38	4,95		0,62	12,38	8,66	0,32
	10 N	0,27									
	11	50,92				3,56		2,56	50,92	3,56	1,30
	12	18,25				1,64		1,09	18,25	1,64	0,47
Zmida	13 A	20,50				5,13		1,44	20,50	5,13	0,46
	13 B	8,15			8,15	2,85		0,49	8,15	5,30	0,18
Chiclura	14	2,67				0,45		0,19	2,67	0,45	0,07
Măloasa	15	23,60				4,72		1,89	23,60	4,72	0,53
	16	4,79				1,20		0,34	4,79	1,20	0,11
Pârâul Izvor	17	12,74				3,19		1,40	12,74	3,19	0,29
Pârâul Dracului	18	13,71	2,74	2,74							
Borciee	19	20,75				1,04		1,24	20,75		0,53

Lucrări propuse, ha	u.a.	Suprafață (ha)	Combaterea eroziunii de adâncime și alunecări* (ha)	Combaterea eroziunii de suprafață a solului (ha)	Tăieri de reducere a consistente** (ha)	Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase** (ha)	Combaterea ferigii mari din pășuni*** (ha/an)	Combaterea altor buruieni** (ha/ah)	Distugerea musuroacelor nivelarea și curățirea pășunilor** (ha)	Indepartarea materiei lemnoase a opatelelor și pietrelor** (ha)	Tărirea pășunilor cu animale*** (ha/an)
Văcăria Mare	39	30,47									0,17
Groapele	40 A	2,33				0,23			2,33		0,01
	40 B	1,37									0,01
	41	2,96				0,59		0,09	2,96	0,59	0,01
	42	5,57				0,56		0,17	5,57		0,02
Tiganul	101 A	65,13									0,27
	101 B	32,06									0,13
	102 A	3,93				0,39		0,12			0,02
	102 B	7,39				1,11		0,30			0,03
	103 A	21,17									0,09
103 B	8,12									0,03	
TOTAL		1532,03	5,90	14,89	20,53	91,98	13,63	44,22	801,99	69,28	25,16

* - Lucrările se vor executa în primul an de la intrarea în vigoare a amenajamentului pastoral;

** - Lucrările se vor executa în primul an de la intrarea în vigoare a amenajamentului pastoral și ori de câte ori este necesar;

*** - Conform punctului 6.3.2. din acest studiu, tăierea se execută astfel: - 3 nopți, 1 oaie/1 metru pătrat,

- 3 nopți, 1 vacă/ 6 metri pătrați, având grijă să nu se depășească pragul de 6 nopți care duce la supratăiere, acest lucru afectând grav covorul ierbos.



Tr. Păș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
1	1	28,68	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 3 ⁹		Exp :		Alt : 495 - 505 m		Unit.sol : brun luvic pseudogleizat	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Agrostis stolonifera</i>				Acoperire ierbacee : 80%			
Gram : 52% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Agrostis stolonifera</i> 10%; <i>Nardus stricta</i> 2%; <i>Poa pratensis</i> 3%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 5%; <i>Festuca sp.</i> 5%; <i>Holcus lanatus</i> 2%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Arrhenatheum elatius</i> 5%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Trifolium repens</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 3%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 31% (<i>Juncus conglomeratus</i> 7%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Rumex acetosa</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Viola sp.</i> 1%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Geranium pratense</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 8% (<i>Ranunculus acer</i> 2%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%)							
Val. past : bună		Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Prunus spinosa</i>			Gr. acop. : 5%		
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :	
Date compl : Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Păș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren	
1	2	26,56	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană	
Încl : 5 ⁹		Exp :		Alt : 500 - 510 m		Unit.sol : brun luvic pseudogleizat		
Date stat suplîm :								
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Agrostis stolonifera</i> - <i>Anthoxantum odoratum</i>				Acoperire ierbacee : 80%				
Gram : 53% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Agrostis stolonifera</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 10%; <i>Festuca sp.</i> 5%; <i>Poa pratensis</i> 3%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 3%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Holcus lanatus</i> 2%; <i>Nardus stricta</i> 5%)								
Leg : 5% (<i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Trifolium repens</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%)								
Div. pl : 34% (<i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Rumex acetosa</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 1%; <i>Juncus conglomeratus</i> 5%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Galium sp.</i> 1%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Geranium pratense</i> 2%; <i>Mentha sp.</i> 2%)								
Pl. dăunătoare + toxice : 8% (<i>Ranunculus acer</i> 2%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%)								
Val. past : bună		Arbuști. :			Gr. acop. :		Răsp. :	
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :		
Date compl : Linii de înaltă tensiune; Mușuroaie								
Lucr.exec. :								
Lucr. prop. : Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.								

Tr. Păș	u.a	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
1	3	10,00	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 3°		Exp : Alt : 505 m		Unit.sol : brun luvic pseudogleizat			
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca</i> sp. - <i>Anthoxanthum odoratum</i>						Acoperire ierbacee : 80%	
Gram : 49% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 10%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 4%; <i>Festuca</i> sp. 10%; <i>Nardus stricta</i> 5%; <i>Poa pratensis</i> 2%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Holcus lanatus</i> 3%)							
Leg : 9% (<i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 35% (<i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Rumex acetosa</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 8%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Carex</i> sp. 5%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Mentha</i> sp. 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Geranium pratense</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 7% (<i>Onopordon acanthium</i> 1%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Ranunculus acer</i> 2%)							
Val. past : bună		Arbuști. : <i>Crataegus</i> sp., <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i>			Gr. acop. : 1%		
Răsp. : întîm							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl : Mușuroaie; Semîniș de PLT		Volum : :					
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Păș	u.a	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
2	4	9,00	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 5°		Exp : Alt : 560 - 570 m		Unit.sol : brun luvic pseudogleizat			
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Agrostis stolonifera</i> - <i>Nardus stricta</i>						Acoperire ierbacee : 85%	
Gram : 58% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Festuca</i> sp. 8%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 10%; <i>Arrhenatheum elatius</i> 5%)							
Leg : 8% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%; <i>Genista sagittalis</i> 2%)							
Div. pl : 28% (<i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Galium</i> sp. 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 1%; <i>Taraxacum officinale</i> 1%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Centaurea</i> sp. 2%; <i>Hieracium aurantiacum</i> 2%; <i>Carex</i> sp. 5%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Carlina vulgaris</i> 2%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Hypericum perforatum</i> 1%; <i>Onopordon acanthium</i> 1%)							
Val. past : bună		Arbuști. : <i>Crataegus</i> sp., <i>Rosa canina</i> , <i>Rubus fruticosus</i>			Gr. acop. : 3%		
Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl : Mușuroaie; Semîniș de PLT, PR, ME		Volum : :					
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
2	5	5,58	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 3 ⁹		Exp :		Alt : 570 - 575 m		Unit.sol : brun luvic pseudogleizat	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Anthoxantum odoratum</i>						Acoperire ierbacee : 85%	
Gram : 63% (<i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 10%; <i>Nardus stricta</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 3%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 10%; <i>Arrhenatheum elatius</i> 5%)							
Leg : 8% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%; <i>Genista sagittalis</i> 2%)							
Div. pl : 24% (<i>Juncus conglomeratus</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Hieracium aurantiacum</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 1%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Carlina vulgaris</i> 1%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Hypericum perforatum</i> 1%; <i>Onopordon acanthium</i> 1%)							
Val. past : bună		Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rubus fruticosus</i>			Gr. acop. : 3%		
Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :	
Date compl : Mușuroaie; Semînțîș de PLT, ME, PR							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
2	6	18,16	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 5 ⁹		Exp :		Alt : 580 m		Unit.sol : brun luvic pseudogleizat	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca rupicola</i> - <i>Nardus stricta</i>						Acoperire ierbacee : 85%	
Gram : 58% (<i>Agrostis capillaris</i> 8%; <i>Festuca rupicola</i> 8%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 15%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 7%; <i>Arrhenatheum elatius</i> 5%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 2%)							
Div. pl : 27% (<i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Carex sp.</i> 3%; <i>Achillea millefolium</i> 4%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Rumex acetosa</i> 1%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Hieracium aurantiacum</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Carlina vulgaris</i> 2%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Hypericum perforatum</i> 1%; <i>Onopordon acanthium</i> 1%)							
Val. past : bună		Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rubus fruticosus</i>			Gr. acop. : 3%		
Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :	
Date compl : Mușuroaie; Semînțîș de PLT, ME							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
2	7	1,14	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 5°		Exp :		Alt : 580 m		Unit.sol : brun luvic pseudogleizat	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Nardus stricta</i>						Acoperire ierbacee : 85%	
Gram : 57% (<i>Agrostis capillaris</i> 12%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Nardus stricta</i> 7%; <i>Holcus lanatus</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 3%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Arrhenatherum elatius</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 5%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 2%)							
Div. pl : 28% (<i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Hieracium aurantiacum</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Carlina vulgaris</i> 2%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Hypericum perforatum</i> 1%; <i>Onopordon acanthium</i> 1%)							
Val. past : bună		Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rubus fruticosus</i>			Gr. acop. : 3%		
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl. :		Mușuroaie; Semînțiș de PLT, ME					
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
3	8	2,92	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Încl : 5°		Exp : N		Alt : 640 - 650 m		Unit.sol : luvisol albic pseudogleizat	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Nardus stricta</i>						Acoperire ierbacee : 70%	
Gram : 56% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Nardus stricta</i> 13%; <i>Agrostis stolonifera</i> 10%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 3%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 5%; <i>Holcus lanatus</i> 3%; <i>Phleum pratense</i> 2%)							
Leg : 6% (<i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%)							
Div. pl : 30% (<i>Plantago lanceolata</i> 1%; <i>Luzula campestris</i> 4%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Ajuga genevensis</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Salvia pratensis</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 1%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Mentha sp.</i> 2%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 8% (<i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Veratrum album</i> 2%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%)							
Val. past : mijlocie		Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus fruticosus</i>			Gr. acop. : 40%		
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl. :		Mușuroaie; Semînțiș de ME, AN, PLT, CI, SAC /0,3S					
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
3	9	29,16	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Incl : 10°		Exp : N		Alt : 605 - 670 m		Unit.sol : erodisol tipic	
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Nardus stricta</i>						Acoperire ierbacee : 70%	
Gram : 57% (<i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Agrostis stolonifera</i> 10%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Holcus lanatus</i> 5%; <i>Phleum pratense</i> 4%; <i>Lolium perenne</i> 3%)							
Leg : 10% (<i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Medicago falcata</i> 2%)							
Div. pl : 26% (<i>Salvia pratensis</i> 1%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 1%; <i>Achillea millefolium</i> 1%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 3%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Mentha sp.</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Carlina acaulis</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 7% (<i>Veratrum album</i> 1%; <i>Pteridium aquilinum</i> 2%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%)							
Val. past : bună		Arbuști. : <i>Rosa canina</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Crataegus sp.</i>				Gr. acop. : 3%	
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	Volum. :
Date compl : Mușuroaie; Seminiș de ME, PLT, SAC/0,05S; În lungul pâraului ME, SAC							
Lucr. exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târșirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
3	10 A	76,57	II - PP	45301	Pășune	Luncă înaltă	plană
Incl : 5°		Exp :		Alt : 585 - 630 m		Unit.sol : sol aluvial tipic	
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Agrostis stolonifera</i>						Acoperire ierbacee : 75%	
Gram : 56% (<i>Agrostis capillaris</i> 13%; <i>Festuca sp.</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 5%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Holcus lanatus</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 5%; <i>Arrhenatherum elatius</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 3%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 2%)							
Div. pl : 29% (<i>Juncus conglomeratus</i> 4%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Hieracium aurantiacum</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Veratrum album</i> 2%; <i>Caltha laeta</i> 1%; <i>Pteridium aquilinum</i> 3%)							
Val. past : mijlocie		Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rubus fruticosus</i>				Gr. acop. : 10%	
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	Volum. :
Date compl : Mușuroaie; Pâlcuri de AN; Vegetației ierbacee incendiată /0,2S							
Lucr. exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târșirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Păș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
3	10 B	1,88	II - PP	45301	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 2 ^o		Exp :		Alt : 585 m		Unit.sol : sol aluvial tipic	
Date stat suplim :							
Tip pajiste : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Anthoxantum odoratum</i>						Acoperire ierbacee : 65%	
Gram : 57% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 10%; <i>Lolium perenne</i> 10%; <i>Holcus lanatus</i> 2%; <i>Nardus stricta</i> 5%; <i>Poa annua</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 5%; <i>Festuca sp.</i> 10%)							
Leg : 7% (<i>Lotus corniculatus</i> 1%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Trifolium repens</i> 2%; <i>Medicago falcată</i> 2%)							
Div. pl : 29% (<i>Juncus conglomeratus</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 1%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Rumex acetosa</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Ajuga genevensis</i> 1%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Mentha sp.</i> 2%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Geranium pratense</i> 2%; <i>Carlina acaulis</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 7% (<i>Ranunculus acer</i> 1%; <i>Carduus acanthoides</i> 1%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 3%)							
Val. past : mijlocie		Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus fruticosus</i>		Gr. acop. : 35%		Răsp. : intim și grupat	
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl : Mușuroaie; Pâlcuri de ME, AN, SAC, Mălin		Volum :					
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajștilor. Tăierea pajștilor cu animale.							

Tr. Păș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
3	10 C	12,38	II - FP	45301	Pășune cu arbori	Versant inferior	ondulată
Încl : 12 ^o		Exp : NV		Alt : 615 - 640 m		Unit.sol : sol aluvial tipic	
Date stat suplim :							
Tip pajiste : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Nardus stricta</i>						Acoperire ierbacee : 60%	
Gram : 59% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Festuca sp.</i> 9%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Holcus lanatus</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 2%; <i>Arrhenatheum elatius</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 3%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 2%)							
Div. pl : 27% (<i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 6%; <i>Carex sp.</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Veratrum album</i> 1%; <i>Caltha laeta</i> 1%; <i>Pteridium aquilinum</i> 3%)							
Val. past : mijlocie		Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rhamnus frangula</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Corylus avellana</i>		Gr. acop. : 40%		Răsp. : intim și grupat	
Veget. forest. : 10AN		Vârsta. : 30 ani		Consist. : 0,3		Răsp. : intim și grupat Volum : 334 m ³	
Date compl : Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tăieri de reducere a consistenței la 0,2. Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajștilor. Tăierea pajștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
3	10N	0,27			Teren neproductiv	Versant inferior	frământată
Încl : 25 ⁹		Exp : V		Alt : 630 m		Unit.sol :	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște :						Acoperire ierbacee :	
Gram :							
Leg :							
Div. pl :							
Pl. dăunătoare + toxice :							
Val. past :		Arbuști. :			Gr. acop. :		Răsp. :
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp:	Volum :
Date compl : Carieră							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. :							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
3	11	50,92	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 4 ⁹		Exp :		Alt : 590 - 615 m		Unit.sol : brun luvic tipic	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Nardus stricta</i>						Acoperire ierbacee : 85%	
Gram : 57% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Holcus lanatus</i> 3%; <i>Agrostis stolonifera</i> 4%; <i>Arrhenatheum elatius</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 3%; <i>Lolium perenne</i> 2%)							
Leg : 10% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 2%)							
Div. pl : 28% (<i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Hieracium aurantiacum</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Veratrum album</i> 1%; <i>Caltha laeta</i> 1%; <i>Pteridium aquilinum</i> 2%; <i>Hypericum perforatum</i> 1%)							
Val. past : mijlocie		Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Rosa canina</i>					
Gr. acop. : 5%		Răsp. : întîm și grupat					
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp:	Volum :
Date compl : Pâlcuri de AN; Semînțiș de PR, ME, PLT; Vegetație ierbacee incendiată; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevalorozose din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
3	12	18,25	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Incl : 3 ^g		Exp :	Alt : 605 - 615 m		Unit.sol : brun luvic tipic		
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca</i> sp.				Acoperire ierbacee : 85%			
Gram : 55% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Festuca</i> sp. 10%; <i>Agrostis stolonifera</i> 5%; <i>Arrhenatherum elatius</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%)							
Leg : 11% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 4%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 2%)							
Div. pl : 28% (<i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Galium</i> sp. 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Hieracium aurantiacum</i> 2%; <i>Carex</i> sp. 5%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Centaurea</i> sp. 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Veratrum album</i> 1%; <i>Caltha laeta</i> 1%; <i>Pteridium aquilinum</i> 1%; <i>Hypericum perforatum</i> 1%; <i>Ranunculus acer</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Crataegus</i> sp., <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rubus fruticosus</i>							
Gr. acop. : 7% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp:	Volum :
Date compl : Seminiș de PR, PLT, ME; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
4	13 A	20,50	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Incl : 15 ^g		Exp : NV	Alt : 640 - 720 m		Unit.sol : brun luvic tipic		
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca</i> sp.				Acoperire ierbacee : 80%			
Gram : 67% (<i>Nardus stricta</i> 30%; <i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Festuca</i> sp. 13%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 3%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 3%; <i>Arrhenatherum elatius</i> 3%)							
Leg : 6% (<i>Trifolium repens</i> 2%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 20% (<i>Carex</i> sp. 5%; <i>Juncus conglomeratus</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Galium</i> sp. 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 1%; <i>Centaurea</i> sp. 2%; <i>Calluna vulgaris</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 7% (<i>Pteridium aquilinum</i> 5%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus</i> sp., <i>Rosa canina</i> , <i>Rhamnus frangula</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> Gr. acop. : 25% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp:	Volum :
Date compl : Pâlcuri de ME; Pâlcuri de AN; Arbori izolați de MO, ME, AN; Seminiș, nucleiș de AN, ME, PLT, MO; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
4	13 B	8,15	II - FP	43321	Pășune cu arbori	Versant	ondulată
Înci : 17 ^g		Exp : NV		Alt : 700 - 780 m		Unit.sol : brun luvic tipic	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Agrostis capillaris</i>				Acoperire ierbacee : 60%			
Gram : 74% (<i>Nardus stricta</i> 30%; <i>Agrostis capillaris</i> 9%; <i>Festuca sp.</i> 15%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 5%; <i>Brachypodium pinnatum</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%)							
Leg : 5% (<i>Trifolium repens</i> 1%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 15% (<i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 4%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 1%; <i>Carex sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Pteridium aquilinum</i> 5%; <i>Carduus acanthoides</i> 1%)							
Val. past : slabă Arbusti. : <i>Juniperus communis</i> , <i>Crataegus sp.</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Rhamnus frangula</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> Gr. acop. : 35% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. : 10ME Vârsta. : 20 ani Consist : 0,3 Răsp: intim și grupat Volum : 114 m ³							
Date compl : Arbori izolați de MO, FA, CA, PLT; Semînțiș, nuieliș de CA, PLT, ME; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tăieri de reducere a consistenței la 0,2. Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
5	14	2,67	II - PP	43321	Pășune	Versant	ondulată
Înci : 17 ^g		Exp : N		Alt : 730 - 800 m		Unit.sol : brun luvic tipic	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Festuca sp.</i> - <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Nardus stricta</i>				Acoperire ierbacee : 80%			
Gram : 58% (<i>Festuca sp.</i> 20%; <i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 3%; <i>Dactylis glomerata</i> 5%)							
Leg : 10% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 4%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 25% (<i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 3%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Calluna vulgaris</i> 1%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 7% (<i>Pteridium aquilinum</i> 4%; <i>Carduus acanthoides</i> 1%; <i>Hypericum perforatum</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Juniperus communis</i> , <i>Crataegus sp.</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> Gr. acop. : 15% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. : Vârsta. : Consist : Răsp: Volum :							
Date compl : Pâlcuri de AN; Pâlcuri de FA, MO, CA; Arbori izolați de MO, FA; Semînțiș, nuieliș de FA, CA, AN, MO							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Târlierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a	Sup (ha)	Gr. funct	T.S	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
6	15	23,60	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Incl : 15 ⁹		Exp : NE		Alt : 630 - 725 m		Unit.sol : brun luvic tipic	
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca sp.</i>				Acoperire ierbacee : 80%			
Gram : 64% (<i>Nardus stricta</i> 30%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 5%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 4%)							
Leg : 7% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 21% (<i>Lycopodium clavatum</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Thymus sp.</i> 2%; <i>Plantago sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Juncus effusus</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 8% (<i>Pteridium aquilinum</i> 5%; <i>Arctium lappa</i> 1%; <i>Carlina vulgaris</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Juniperus communis</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus sp.</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Rhamnus frangula</i> Gr. acop. : 20% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	Volum. :
Date compl : Pălcuri de ME, AN; Arbori izolați de CA, MO, FA, PLT; Semintiș, nuieliș de ME, CA; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a	Sup (ha)	Gr. funct	T.S	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
6	16	4,79	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Incl : 13 ⁹		Exp : N		Alt : 620 - 640 m		Unit.sol : brun luvic tipic	
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca sp.</i>				Acoperire ierbacee : 80%			
Gram : 63% (<i>Nardus stricta</i> 30%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Brachypodium pinnatum</i> 5%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 3%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 21% (<i>Juncus conglomeratus</i> 2%; <i>Lycopodium clavatum</i> 2%; <i>Juncus effusus</i> 2%; <i>Thymus sp.</i> 2%; <i>Plantago sp.</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 3%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 7% (<i>Pteridium aquilinum</i> 5%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Rhamnus frangula</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Rubus fruticosus</i> Gr. acop. : 25% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	Volum. :
Date compl : Pălcuri de ME, AN; Semintiș, nuieliș de CA, FA, AN, ME; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
7	17	12,74	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Încl : 15 ^o		Exp : NE		Alt : 620 - 670 m		Unit.sol : brun luvic tipic	
Date stat suplim :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Agrostis capillaris</i>				Acoperire ierbacee : 80%			
Gram : 61% (<i>Nardus stricta</i> 20%; <i>Festuca sp.</i> 13%; <i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Brachypodium pinnatum</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 3%; <i>Dactylis glomerata</i> 5%)							
Leg : 10% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 4%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 18% (<i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Lycopodium clavatum</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 2%; <i>Juncus effusus</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Thymus sp.</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 11% (<i>Pteridium aquilinum</i> 5%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Hypericum perforatum</i> 2%; <i>Carlina vulgaris</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rhamnus frangula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> Gr. acop. : 25% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp:	Volum :
Date compl : Semintiș, nuieliș de AN; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
8	18	13,71	I - PS	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Încl : 10 ^o		Exp : N		Alt : 590 - 630 m		Unit.sol : brun luvic tipic	
Date stat suplim : Eroziune în suprafață puternică, eroziune în adâncime slabă							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Nardus stricta</i>				Acoperire ierbacee : 65%			
Gram : 65% (<i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Festuca rupicola</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Festuca sp.</i> 15%)							
Leg : 4% (<i>Trifolium pratense</i> 1%; <i>Trifolium repens</i> 1%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%; <i>Lathyrus pratensis</i> 1%)							
Div. pl : 25% (<i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 1%; <i>Rumex acetosa</i> 1%; <i>Achillea millefolium</i> 1%; <i>Juncus conglomeratus</i> 5%; <i>Viola sp.</i> 1%; <i>Galium sp.</i> 1%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Geranium pratense</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Mentha sp.</i> 3%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Carduus acanthoides</i> 1%; <i>Veratrum album</i> 1%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Corylus avellana</i> Gr. acop. : 5% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp:	Volum :
Date compl : Pâcuri de AN; Semintiș de AN, ME; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea eroziunii de adâncime și alunecări. Combaterea eroziunii de suprafață a solului.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos	Unit. rel.	Conf. teren
9	19	20,75	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Încl : 7°		Exp : N		Alt : 595 - 625 m		Unit.sol : brun luvic tipic	
Date stat suplîm : Eroziune în suprafață slabă							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Anthoxantum odoratum</i>						Acoperire ierbacee : 80%	
Gram : 64% (<i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 10%; <i>Festuca sp.</i> 15%; <i>Nardus stricta</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 5%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Phleum pratense</i> 4%)							
Leg : 3% (<i>Lotus corniculatus</i> 1%; <i>Trifolium pratense</i> 1%; <i>Trifolium repens</i> 1%)							
Div. pl : 27% (<i>Juncus conglomeratus</i> 5%; <i>Luzula campestris</i> 3%; <i>Carex sp.</i> 2%; <i>Viola sp.</i> 1%; <i>Galium sp.</i> 1%; <i>Achillea millefolium</i> 1%; <i>Rumex acetosa</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Geranium pratense</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Mentha sp.</i> 2%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Carduus acanthoides</i> 1%; <i>Veratrum album</i> 1%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%)							
Val. past : bună						Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Corylus avellana</i>	
Gr. acop. : 5%							
Răsp. : întim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Volum :							
Date compl : Arbori izolați de AN, SAC, CA, ME; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tăierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos	Unit. rel.	Conf. teren
10	20 A	53,16	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 5°		Exp :		Alt : 545 - 585 m		Unit.sol : luvisol albic pseudogleizat	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Nardus stricta</i>						Acoperire ierbacee : 95%	
Gram : 60% (<i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Festuca sp.</i> 15%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 3%; <i>Festuca pseudovina</i> 2%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Agrostis stolonifera</i> 5%)							
Leg : 8% (<i>Lotus corniculatus</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Trifolium repens</i> 2%)							
Div. pl : 27% (<i>Achillea millefolium</i> 1%; <i>Plantago lanceolata</i> 1%; <i>Rumex acetosa</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 5%; <i>Luzula campestris</i> 1%; <i>Carex sp.</i> 1%; <i>Veronica chamaedrys</i> 1%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Geranium pratense</i> 2%; <i>Carlina acaulis</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Mentha sp.</i> 2%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 3%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Ranunculus acer</i> 1%; <i>Veratrum album</i> 1%; <i>Carduus acanthoides</i> 1%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%)							
Val. past : bună						Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i>	
Gr. acop. : 2%							
Răsp. : întim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Volum :							
Date compl : Semînțiș de PLT, ME, PR; Mușuroaie; Drum de pământ							
Lucr.exec. : Cosire							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tăierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Păș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
10	20 B	10,84	I - PS	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 5 ⁹		Exp :		Alt : 540 - 550 m		Unit.sol : luvisol albic pseudogleizat	
Date stat suplim : Eroziune de suprafață moderată, puternică							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca</i> sp. - <i>Anthoxantum odoratum</i>				Acoperire ierbacee : 50%			
Gram : 66% (<i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 10%; <i>Dactylis glomerata</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 10%; <i>Festuca</i> sp. 10%; <i>Agrostis stolonifera</i> 6%; <i>Alopecurus pratensis</i> 5%; <i>Phleum pratense</i> 5%)							
Leg : 3% (<i>Lotus corniculatus</i> 1%; <i>Genista tinctoria</i> 1%; <i>Trifolium pratense</i> 1%)							
Div. pl : 29% (<i>Juncus conglomeratus</i> 15%; <i>Plantago lanceolata</i> 5%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Carex</i> sp. 1%; <i>Luzula campestris</i> 1%; <i>Rumex acetosa</i> 2%; <i>Ajuga genevensis</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 1%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 2% (<i>Carduus acanthoides</i> 1%; <i>Veratrum album</i> 1%)							
Val. past : slabă				Arbuști. : <i>Crataegus</i> sp., <i>Prunus spinosa</i> , <i>Corylus avellana</i>		Gr. acop. : 2%	
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Volum :							
Date compl : Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea eroziunii de suprafață a solului.							

Tr. Păș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
10	21 A	94,32	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 5 ⁹		Exp :		Alt : 545 - 595 m		Unit.sol : luvisol albic pseudogleizat	
Date stat suplim : Mici porțiuni cu eroziune de suprafață moderată							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca</i> sp.				Acoperire ierbacee : 90%			
Gram : 50% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 5%; <i>Holcus lanatus</i> 5%; <i>Festuca pseudovina</i> 5%; <i>Festuca</i> sp. 10%; <i>Agrostis stolonifera</i> 5%)							
Leg : 6% (<i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Trifolium repens</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%)							
Div. pl : 38% (<i>Juncus conglomeratus</i> 7%; <i>Luzula campestris</i> 5%; <i>Carex</i> sp. 5%; <i>Plantago lanceolata</i> 1%; <i>Rumex acetosa</i> 1%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 1%; <i>Veronica chamaedrys</i> 1%; <i>Urtica dioica</i> 3%; <i>Mentha</i> sp. 3%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 5%; <i>Cichorium inthibus</i> 2%; <i>Geranium pratense</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Ranunculus acer</i> 1%; <i>Carduus acanthoides</i> 1%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%)							
Val. past : bună				Arbuști. : <i>Crataegus</i> sp., <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Corylus avellana</i>		Gr. acop. : 5%	
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Volum :							
Date compl : Arbori izolați de PLT, ME, SC, AN; Mușuroaie; A se evita porțiunile cu eroziune							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea eroziunii de suprafață a solului. Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș.	u.a	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
10	21 B	3,97	II - PP	43321	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 5 ^o		Exp :		Alt : 545 - 570 m		Unit.sol : luvisol albic pseudogleizat	
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i> - <i>Anthoxantum odoratum</i>						Acoperire ierbacee : 80%	
Gram : 63% (<i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 10%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 5%; <i>Festuca sp.</i> 15%; <i>Agrostis stolonifera</i> 5%; <i>Phleum pratense</i> 5%; <i>Festuca pseudovina</i> 3%)							
Leg : 5% (<i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Trifolium repens</i> 2%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%)							
Div. pl : 26% (<i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Viola sp.</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Mentha sp.</i> 2%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Ranunculus acer</i> 1%; <i>Carduus acanthoides</i> 1%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%; <i>Dipsacus laciniatus</i> 2%)							
Val. past : bună						Arbuști. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i>	
Răsp. : intim și grupat						Gr. acop. : 2%	
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl. :		Mușuroaie					
Lucr. exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tăierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș.	u.a	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
11	22	36,63	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Încl : 12 ^o		Exp : N		Alt : 580 - 645 m		Unit.sol : luvisol albic pseudogleizat	
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i>						Acoperire ierbacee : 85%	
Gram : 55% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Nardus stricta</i> 25%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 3%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 2%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 24% (<i>Carex sp.</i> 5%; <i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 12% (<i>Pteridium aquilinum</i> 10%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%)							
Val. past : mijlocie						Arbuști. : <i>Juniperus communis</i> , <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>	
Răsp. : intim și grupat						Gr. acop. : 15%	
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl. :		Arbori izolați de ME, MO, PLT; Semințiș, nuieliș de ME, AN; În lungul pârâului AN, PLT, SAC; Mușuroaie					
Lucr. exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea ferigii mari din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tăierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
11	23 A	84,06	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Incl : 10 ⁹ (5-15)		Exp : NV		Alt : 550 - 640 m		Unit.sol : luvisol albic pseudogleizat	
Date stat supliment : Mici porțiuni cu eroziune în suprafață slabă							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca</i> sp.				Acoperire ierbacee : 85%			
Gram : 56% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Festuca</i> sp. 10%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 15%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 3%; <i>Arrhenatheum elatius</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Poa pratensis</i> 3%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 23% (<i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Juncus effusus</i> 2%; <i>Galium</i> sp. 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Viola</i> sp. 1%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 1%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Carex</i> sp. 4%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 12% (<i>Pteridium aquilinum</i> 10%; <i>Hypericum perforatum</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști : <i>Crataegus</i> sp., <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> Gr. acop. : 10% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :	
Date compl : Arbori izolați de AN, CA, ME, PLT; Pâlcuri de CA, ME, PLT; Semînțiș, nuieliș de CA, PLT, ME, AN; În lungul pâraului AN; Mușuroaie; A se evita porțiunile cu eroziune							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea eroziunii de suprafață a solului. Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea ferigiilor mari din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
11	23 B	11,83	II - PP	43321	Pășune	Luncă joasă	plană
Incl : 2 ⁹		Exp :		Alt : 550 - 580 m		Unit.sol : luvisol albic pseudogleizat	
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Agrostis stolonifera</i> - <i>Festuca</i> sp.				Acoperire ierbacee : 90%			
Gram : 61% (<i>Agrostis capillaris</i> 18%; <i>Agrostis stolonifera</i> 10%; <i>Festuca</i> sp. 10%; <i>Arrhenatheum elatius</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Poa annua</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 3%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 24% (<i>Juncus conglomeratus</i> 5%; <i>Carex</i> sp. 5%; <i>Galium</i> sp. 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Viola</i> sp. 1%; <i>Symphytum officinale</i> 1%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Centaurea</i> sp. 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Ranunculus acer</i> 2%; <i>Equisetum</i> sp. 2%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști : <i>Crataegus</i> sp., <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Corylus avellana</i> Gr. acop. : 15% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :	
Date compl : Arbori izolați de SAC, AN; În lungul pâraului AN, SAC; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
11	24	32,24	II - PP	43321	Pășune	Versant inferior	ondulată
Încl : 14 ^g		Exp : NV		Alt : 570 - 640 m		Unit.sol : luvisol albic pseudogleizat	
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i>						Acoperire ierbacee : 85%	
Gram : 60% (<i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Festuca sp.</i> 12%; <i>Nardus stricta</i> 20%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 3%)							
Leg : 9% (<i>Trifolium repens</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 1%)							
Div. pl : 23% (<i>Carex sp.</i> 5%; <i>Juncus conglomeratus</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Centaurea sp.</i> 2%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 8% (<i>Pteridium aquilinum</i> 5%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Hypericum perforatum</i> 1%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Juniperus communis</i>							
Gr. acop. : 10% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl : Arbori izolați de CA, MO; Seminiș, nuieliș de ME, CA, PLT							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
12	25	19,94	II - PP	45301	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 5 ^g		Exp :		Alt : 545 m		Unit.sol : sol aluvial pseudogleizat	
Date stat supliment :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i>						Acoperire ierbacee : 85%	
Gram : 66% (<i>Agrostis capillaris</i> 14%; <i>Nardus stricta</i> 25%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 2%; <i>Arrhenantheum elatius</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 5%)							
Leg : 11% (<i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Trifolium repens</i> 4%; <i>Lotus comiculatus</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 2%)							
Div. pl : 19% (<i>Rumex acetosa</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Viola sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 4% (<i>Pteridium aquilinum</i> 2%; <i>Hypericum perforatum</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> Gr. acop. : 5%							
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl : În lungul pâraului AN, ANN, SAC; Seminiș de PLT, AN; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
13	26	63,24	II - PP	45301	Pășune	Luncă înaltă	plană
Încl : 5 ^o		Exp :		Alt : 550 - 580 m		Unit.sol : sol aluvial pseudogleizat	
Date stat suplîm : Eroziune de suprafață, în adâncime slabă /0,05S (șanțuri)							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i>				Acoperire ierbacee : 85%			
Gram : 70% (<i>Nardus stricta</i> 30%; <i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Festuca sp.</i> 10%; <i>Arrhenantheum elatius</i> 5%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 5%)							
Leg : 5% (<i>Trifolium pratense</i> 1%; <i>Trifolium repens</i> 2%; <i>Genista sagittalis</i> 1%; <i>Lotus corniculatus</i> 1%)							
Div. pl : 20% (<i>Juncus conglomeratus</i> 5%; <i>Daucus carota</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 1%; <i>Thymus montanus</i> 2%; <i>Viola sp.</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Pteridium aquilinum</i> 3%; <i>Veratrum album</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Juniperus communis</i>							
Gr. acop. : 10% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp:	Volum :
Date compl : În lungul pârâului AN, ANN; Seminiș de ANN, PLT, ME; Drumuri de pământ; Plantație de afin							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea eroziunii de adâncime și alunecări. Combaterea eroziunii de suprafață a solului. Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
13	27	28,30	II - PP	45301	Pășune	Versant inferior	ondulată
Încl : 15 ^o		Exp : N		Alt : 570 - 630 m		Unit.sol : sol aluvial pseudogleizat	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Festuca sp.</i>				Acoperire ierbacee : 80%			
Gram : 68% (<i>Nardus stricta</i> 25%; <i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Festuca sp.</i> 13%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Brachypodium pinnatum</i> 5%; <i>Calamagrostis epigeios</i> 5%)							
Leg : 8% (<i>Trifolium repens</i> 2%; <i>Trifolium pratense</i> 3%; <i>Genista sagittalis</i> 1%; <i>Lotus corniculatus</i> 2%)							
Div. pl : 17% (<i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Prunella vulgaris</i> 2%; <i>Taraxacum officinale</i> 2%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Galium sp.</i> 2%; <i>Veronica chamaedrys</i> 2%; <i>Viola sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 7% (<i>Pteridium aquilinum</i> 5%; <i>Hypericum perforatum</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Crataegus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Juniperus communis</i>							
Gr. acop. : 20% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp:	Volum :
Date compl : În lungul pârâului AN, CA, SAC; Seminiș de ME, CA, AN, PLT; Pâcuri de AN, CA, MO; Drum de pământ							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
13	28	10,38	II - PP	45301	Pășune	Versant inferior	ondulată
Încl : 15 ^g		Exp : NV		Alt : 575 - 615 m		Unit.sol : sol aluvial pseudogleizat	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Agrostis capillaris</i>				Acoperire ierbacee : 85%			
Gram : 46% (<i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Nardus stricta</i> 20%; <i>Festuca sp.</i> 5%; <i>Lolium perenne</i> 5%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 3%; <i>Arrhenantheum elatius</i> 3%)							
Leg : 10% (<i>Genista sagittalis</i> 3%; <i>Lotus corniculatus</i> 3%; <i>Trifolium pratense</i> 2%; <i>Trifolium repens</i> 2%)							
Div. pl : 25% (<i>Achillea millefolium</i> 1%; <i>Cichorium inthybus</i> 2%; <i>Geranium pratense</i> 2%; <i>Plantago lanceolata</i> 2%; <i>Carlina acaulis</i> 2%; <i>Juncus conglomeratus</i> 3%; <i>Luzula campestris</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Veronica chamaedrys</i> 1%; <i>Agrimonia eupatoria</i> 1%; <i>Viola sp.</i> 2%; <i>Galium sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 19% (<i>Pteridium aquilinum</i> 15%; <i>Carduus acanthoides</i> 2%; <i>Onopordon acanthium</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Juniperus communis</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>							
Gr. acop. : 5% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :	
Date compl : Semînțîș de CA, ME; Arbori izolați de CA, FA, ME, MO; Pălcuri de CA, ME, MO, PLT							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea ferigii mari din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
14	29	16,08	II - PP	23112	Pășune	Versant superior	ondulată
Încl : 20 ^g		Exp : NE		Alt : 1450 - 1590 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Agrostis capillaris</i>				Acoperire ierbacee : 80%			
Gram : 74% (<i>Festuca rubra</i> 33%; <i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 3%; <i>Nardus stricta</i> 7%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 9%; <i>Poa media</i> 2%)							
Leg : 3% (<i>Trifolium sp.</i> 3%)							
Div. pl : 18% (<i>Carex sp.</i> 5%; <i>Pulsatilla alpina</i> 1%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 2%; <i>Campanula alpina</i> 1%; <i>Plantago sp.</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 5%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Juniperus communis</i>							
Gr. acop. : 15% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :	
Date compl : Arbori izolați de MO; Pălcuri de MO							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
15	30	81,04	I - PS	23113	Pășune	Versant superior	ondulată
Înci : 36 ^g (25-40)		Exp : NE		Alt : 1590 - 1975 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,1S							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Agrostis capillaris</i>				Acoperire ierbacee : 75%			
Gram : 72% (<i>Festuca rubra</i> 25%; <i>Agrostis capillaris</i> 17%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Festuca ovina</i> ssp. <i>sudetica</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 7%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Agrostis rupestris</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 3%)							
Leg : 3% (<i>Trifolium</i> sp. 3%)							
Div. pl : 20% (<i>Carex</i> sp. 5%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Luzula</i> sp. 5%; <i>Campanula alpina</i> 2%; <i>Plantago</i> sp. 3%; <i>Campanula</i> sp. 1%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 20% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl. :		Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO					
Lucr. exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup (ha)	Gr. funct	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
16	31	60,19	I - PS	23113	Pășune	Versant superior	frământată
Înci : 37 ^g		Exp : NE		Alt : 1470 - 2180 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,3S							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Agrostis capillaris</i>				Acoperire ierbacee : 70%			
Gram : 73% (<i>Festuca rubra</i> 25%; <i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Agrostis rupestris</i> 7%; <i>Festuca ovina</i> ssp. <i>sudetica</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 7%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 4%)							
Leg : 2% (<i>Trifolium</i> sp. 2%)							
Div. pl : 19% (<i>Carex</i> sp. 5%; <i>Campanula alpina</i> 2%; <i>Plantago</i> sp. 2%; <i>Potentilla ternata</i> 2%; <i>Luzula</i> sp. 5%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula</i> sp. 1%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 6% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 3%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Juniperus communis</i> Gr. acop. : 15% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl. :		Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO					
Lucr. exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
17	32 A	63,26	I - PS	23113	Pășune	Versant superior	frământată
Înc. : 38 ⁹ (30-42)		Exp : NE		Alt : 2000 - 2285 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,4S							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Nardus stricta</i>				Acoperire ierbacee : 60%			
Gram : 73% (<i>Festuca rubra</i> 26%; <i>Agrostis capillaris</i> 17%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 6%; <i>Sesleria sp.</i> 2%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 2%)							
Leg : 2% (<i>Trifolium sp.</i> 2%)							
Div. pl : 20% (<i>Carex sp.</i> 5%; <i>Campanula alpina</i> 2%; <i>Juncus trifidus</i> 1%; <i>Potentilla ternata</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 5%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Plantago sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : slabă		Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i>		Gr. acop. : 25%		Răsp. : intim și grupat	
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl. :		Vegetație incendiată					
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
17	32 B	30,07	I - PS	23113	Pășune	Versant	frământată
Înc. : 36 ⁹ (28-40)		Exp : NE		Alt : 1670 - 2050 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,3S							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Nardus stricta</i>				Acoperire ierbacee : 55%			
Gram : 73% (<i>Festuca rubra</i> 25%; <i>Agrostis capillaris</i> 15%; <i>Poa media</i> 2%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 8%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Sesleria sp.</i> 3%)							
Leg : 2% (<i>Trifolium sp.</i> 2%)							
Div. pl : 20% (<i>Carex sp.</i> 5%; <i>Campanula alpina</i> 2%; <i>Juncus trifidus</i> 2%; <i>Potentilla ternata</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 4%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Plantago sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : slabă		Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i>		Gr. acop. : 45%		Răsp. : intim și grupat	
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl. :							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup (ha)	Gr. funct.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
17	33	27,16	I - PC	23111	Pășune	Versant superior	ondulată
Înci : 15 ^g		Exp : SV		Alt : 2120 - 2285 m		Unit.sol : sol humicosilicatic criptosporic	
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,05S							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 85%							
Gram : 69% (<i>Nardus stricta</i> 25%; <i>Festuca rubra</i> 9%; <i>Agrostis rupestris</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 5%; <i>Sesleria sp.</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 17%; <i>Poa alpina</i> 3%)							
Leg :							
Div. pl : 26% (<i>Juncus trifidus</i> 12%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Potentilla ternata</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Soldanella pusilla</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschy</i>							
Gr. acop. : 10% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :	
Date compl :							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup (ha)	Gr. funct.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
17	34 A	20,36	I - PC	23111	Pășune	Versant superior	ondulată
Înci : 15 ^g		Exp : N		Alt : 2095 - 2195 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,05S							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 85%							
Gram : 60% (<i>Nardus stricta</i> 20%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 12%; <i>Sesleria sp.</i> 5%; <i>Poa alpina</i> 5%; <i>Festuca rubra</i> 8%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Agrostis rupestris</i> 5%)							
Leg :							
Div. pl : 36% (<i>Carex sp.</i> 15%; <i>Potentilla ternata</i> 2%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Juncus trifidus</i> 13%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 4% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 2%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschy</i>							
Gr. acop. : 10% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist :		Răsp: Volum :	
Date compl :							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
17	34 B	46,85	I - PS	23113	Pășune	Versant superior frământată	
Încl : 42 ^g (30-48)		Exp : NE		Alt : 1620 - 2145 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stîncărie /0,4S							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> Acoperire ierbacee : 55%							
Gram : 80% (<i>Festuca rubra</i> 25%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 7%; <i>Poa media</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 15%; <i>Agrostis capillaris</i> 8%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 5%)							
Leg : 1% (<i>Trifolium sp.</i> 1%)							
Div. pl : 15% (<i>Carex sp.</i> 5%; <i>Campanula alpina</i> 2%; <i>Potentilla ternata</i> 1%; <i>Luzula sp.</i> 4%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 4% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 2%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : slabă Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschy</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i> Gr. acop. : 60% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. : Volum :	
Date compl :							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Târîrea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funct.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
18	35 A	35,34	I - PC	23113	Pășune	Versant superior ondulată	
Încl : 30 ^g (25-35)		Exp : NV		Alt : 1600 - 2175 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stîncărie /0,15S							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 80%							
Gram : 72% (<i>Nardus stricta</i> 17%; <i>Agrostis rupestris</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa alpina</i> 5%; <i>Festuca rubra</i> 10%; <i>Sesleria sp.</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 15%; <i>Agrostis capillaris</i> 10%)							
Leg : 3% (<i>Trifolium sp.</i> 3%)							
Div. pl : 20% (<i>Carex sp.</i> 5%; <i>Plantago sp.</i> 3%; <i>Potentilla ternata</i> 2%; <i>Juncus trifidus</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 5%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschy</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 25% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. : Volum :	
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Târîrea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
18	35 B	38,94	I - PS	23113	Pășune	Versant superior frământată	
Încl : 42 ⁹ (36-48) Exp : NV Alt : 1510 - 2000 m Unit.sol : podzol litic							
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,4S							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> Acoperire ierbacee : 50%							
Gram : 74% (<i>Nardus stricta</i> 15%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Sesleria sp.</i> 3%; <i>Festuca rubra</i> 25%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 14%; <i>Poa alpina</i> 2%)							
Leg : 2% (<i>Trifolium sp.</i> 2%)							
Div. pl : 19% (<i>Plantago sp.</i> 5%; <i>Luzula sp.</i> 3%; <i>Pulsatilla alpina</i> 1%; <i>Potentilla ternata</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 3%; <i>Campanula alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Juncus trifidus</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : slabă Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i> Gr. acop. : 60% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. : Vârsta. : Consist : Răsp: Volum :							
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
18	36	18,29	I - PS	23113	Pășune	Versant superior ondulată	
Încl : 35 ⁹ (30-38) Exp : NE Alt : 1690 - 2030 m Unit.sol : podzol litic							
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,2S							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 65%							
Gram : 63% (<i>Nardus stricta</i> 18%; <i>Festuca rubra</i> 10%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Agrostis rupestris</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 5%)							
Leg :							
Div. pl : 32% (<i>Juncus trifidus</i> 10%; <i>Luzula sp.</i> 5%; <i>Carex sp.</i> 8%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 2%; <i>Soldanella pusilla</i> 1%; <i>Plantago sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 2%; <i>Cetraria islandica</i> 3%)							
Val. past : slabă Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 50% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. : Vârsta. : Consist : Răsp: Volum :							
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
18	37 A	43,86	I - PS	23113	Pășune	Versant	frământată
Încl : 36 ^g (32-45) Exp : NE Alt : 1760 - 2150 m Unit.sol : podzol litic							
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,3S							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 70%							
Gram : 66% (<i>Nardus stricta</i> 16%; <i>Agrostis rupestris</i> 10%; <i>Festuca rubra</i> 10%; <i>Poa violacea</i> 3%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 10%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 12%)							
Leg :							
Div. pl : 29% (<i>Juncus trifidus</i> 5%; <i>Luzula sp.</i> 7%; <i>Carex sp.</i> 8%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 2%; <i>Soldanella pusilla</i> 1%; <i>Plantago sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 2%; <i>Cetraria islandica</i> 3%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 30% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. : Vârsta. : Consist : Răsp: Volum :							
Date compl :							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
18	37 B	17,13	I - PS	23113	Pășune	Versant	ondulată
Încl : 38 ^g (32-40) Exp : NE Alt : 1570 - 1920 m Unit.sol : podzol litic							
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 50%							
Gram : 76% (<i>Nardus stricta</i> 30%; <i>Festuca rubra</i> 15%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 1%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 15%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 3%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa media</i> 2%)							
Leg :							
Div. pl : 21% (<i>Juncus trifidus</i> 3%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 8%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Soldanella pusilla</i> 1%; <i>Plantago sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 3% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 2%; <i>Cetraria islandica</i> 1%)							
Val. past : slabă Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 65% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. : Vârsta. : Consist : Răsp: Volum :							
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâcuri de MO							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
18	38	5,67	I - PC	23113	Pășune	Versant superior	ondulată
Încl : 32 ⁹ (28-38) Exp : NE Alt : 1900 - 2000 m Unit.sol : podzol litic							
Date stat suplim : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,15S							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 75%							
Gram : 61% (<i>Nardus stricta</i> 26%; <i>Festuca rubra</i> 5%; <i>Agrostis rupestris</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 5%; <i>Sesleria sp.</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 15%)							
Leg :							
Div. pl : 34% (<i>Juncus trifidus</i> 10%; <i>Carex sp.</i> 15%; <i>Potentilla ternata</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Soldanella pusilla</i> 1%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschy</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 15% Răsp. : întim și grupat							
Veget. forest. : Vârsta. : Consist : Răsp: Volum :							
Date compl :							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
19	39	30,47	I - PC	23111	Pășune	Versant superior	ondulată
Încl : 15 ⁹ Exp : N Alt : 1860 - 2175 m Unit.sol : podzol litic							
Date stat suplim : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,1S							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Agrostis rupestris</i>							
Acoperire ierbacee : 80%							
Gram : 63% (<i>Nardus stricta</i> 20%; <i>Agrostis rupestris</i> 10%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa alpina</i> 2%; <i>Festuca rubra</i> 8%; <i>Sesleria sp.</i> 3%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 15%)							
Leg :							
Div. pl : 33% (<i>Potentilla ternata</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 15%; <i>Juncus trifidus</i> 10%; <i>Campanula sp.</i> 2%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 4% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 2%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbusti. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschy</i> , <i>Pinus mugo</i> Gr. acop. : 10% Răsp. : întim și grupat							
Veget. forest. : Vârsta. : Consist : Răsp: Volum :							
Date compl :							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
20	40 A	2,33	II - PP	23111	Pășune	Versant	ondulată
Încl : 12°		Exp : N		Alt : 1500 - 1540 m		Unit.sol : podzol tipic	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Nardus stricta</i>				Acoperire ierbacee : 85%			
Gram : 68% (<i>Festuca rubra</i> 23%; <i>Nardus stricta</i> 15%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Poa media</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 10%; <i>Festuca ovina</i> 5%)							
Leg : 5% (<i>Trifolium sp.</i> 5%)							
Div. pl : 25% (<i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Juncus effusus</i> 2%; <i>Alchemilla vulgaris</i> 3%; <i>Campanula sp.</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Rumex alpinus</i> 2%; <i>Plantago sp.</i> 3%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 2% (<i>Veratrum album</i> 2%)							
Val. past : mijlocie		Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Juniperus communis</i>			Gr. acop. : 10%		
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO; Mușuroaie							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
20	40 B	1,37	I - PS	23113	Pășune	Versant	ondulată
Încl : 38°		Exp : NV		Alt : 1520 - 1710 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm : Culoar de avalanșă							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca rubra</i>				Acoperire ierbacee : 50%			
Gram : 76% (<i>Festuca rubra</i> 20%; <i>Nardus stricta</i> 26%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 10%; <i>Festuca ovina</i> 5%)							
Leg : 2% (<i>Trifolium sp.</i> 2%)							
Div. pl : 22% (<i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 10%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Juncus effusus</i> 1%; <i>Alchemilla vulgaris</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Urtica dioica</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice :							
Val. past : slabă		Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Alnus viridis</i>			Gr. acop. : 50%		
Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
20	41	2,96	II - PP	23111	Pășune	Versant	ondulată
Încl : 15 ^o		Exp : NV		Alt : 1400 - 1530 m		Unit.sol : podzol tipic	
Date staț suplîm :							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Nardus stricta</i>				Acoperire ierbacee : 85%			
Gram : 67% (<i>Festuca rubra</i> 25%; <i>Nardus stricta</i> 12%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Poa media</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 10%; <i>Festuca ovina</i> 5%)							
Leg : 5% (<i>Trifolium sp.</i> 5%)							
Div. pl : 25% (<i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Juncus effusus</i> 2%; <i>Alchemilla vulgaris</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Urtica dioica</i> 4%; <i>Rumex alpinus</i> 2%; <i>Plantago sp.</i> 3%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 3% (<i>Veratrum album</i> 3%)							
Val. past : mijlocie		Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Juniperus communis</i>		Gr. acop. : 20%			
Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl		: Arbori izolați de MO; Pălcuri de MO; Mușuroaie					
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor și pietrelor. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târțirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
20	42	5,57	II - PP	23112	Pășune	Versant	ondulată
Încl : 20 ^o		Exp : NE		Alt : 1440 - 1570 m		Unit.sol : podzol tipic	
Date staț suplîm :							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Nardus stricta</i>				Acoperire ierbacee : 85%			
Gram : 69% (<i>Festuca rubra</i> 29%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Poa media</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 10%; <i>Festuca ovina</i> 5%)							
Leg : 5% (<i>Trifolium sp.</i> 5%)							
Div. pl : 23% (<i>Plantago sp.</i> 3%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Juncus effusus</i> 2%; <i>Alchemilla vulgaris</i> 2%; <i>Rumex alpinus</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 3% (<i>Veratrum album</i> 3%)							
Val. past : mijlocie		Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Juniperus communis</i>		Gr. acop. : 10%			
Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl		: Arbori izolați de MO; Pălcuri de MO; Mușuroaie					
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Distrugerea mușuroaielor, nivelarea și curățirea pajiștilor. Târțirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup (ha)	Gr. funct.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
21	101 A	65,13	I - PS	23113	Pășune	Versant superior	ondulată
Incl : 36 ^g (28-40) Exp : E Alt : 1690 - 2000 m Unit.sol : podzol litic							
Date stat supliment : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,1S							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 80%							
Gram : 65% (<i>Nardus stricta</i> 15%; <i>Festuca rubra</i> 10%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Agrostis rupestris</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 15%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 5%)							
Leg :							
Div. pl : 30% (<i>Juncus trifidus</i> 8%; <i>Luzula sp.</i> 5%; <i>Carex sp.</i> 8%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 2%; <i>Soldanella pusilla</i> 1%; <i>Plantago sp.</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 2%; <i>Cetraria islandica</i> 3%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 25% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. : Vârsta. : Consist. : Răsp. : Volum :							
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâcuri de MO							
Lucr. exec. :							
Lucr. prop. : Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup (ha)	Gr. funct.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
21	101 B	32,06	I - PS	23113	Pășune	Versant	ondulată
Incl : 40 ^g (35-45) Exp : E Alt : 1350 - 1880 m Unit.sol : podzol litic							
Date stat supliment : Culoare de avalanșă							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 60%							
Gram : 75% (<i>Nardus stricta</i> 15%; <i>Festuca rubra</i> 10%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Agrostis rupestris</i> 10%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 15%; <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 10%; <i>Festuca ovina</i> 5%)							
Leg :							
Div. pl : 22% (<i>Carex sp.</i> 10%; <i>Luzula sp.</i> 3%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 2%; <i>Plantago sp.</i> 2%; <i>Soldanella pusilla</i> 1%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 3% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%)							
Val. past : slabă Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschyi</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 50% Răsp. : intim și grupat							
Veget. forest. : Vârsta. : Consist. : Răsp. : Volum :							
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâcuri de MO							
Lucr. exec. :							
Lucr. prop. : Târlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
21	102 A	3,93	II - PP	23112	Pășune	Versant	ondulată
Încl : 22 ^a		Exp : N		Alt : 1385 - 1485 m		Unit.sol : sol humicosilicatic criptosodic	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Nardus stricta</i> - <i>Agrostis capillaris</i>						Acoperire ierbacee : 85%	
Gram : 70% (<i>Nardus stricta</i> 15%; <i>Festuca rubra</i> 20%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 10%; <i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Poa media</i> 5%; <i>Festuca ovina</i> 5%)							
Leg : 5% (<i>Trifolium sp.</i> 5%)							
Div. pl : 22% (<i>Plantago sp.</i> 2%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Alchemilla vulgaris</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Juncus effusus</i> 2%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Rumex alpinus</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 3% (<i>Veratrum album</i> 3%)							
Val. past : mijlocie						Arbuști. : <i>Juniperus communis</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>	
Răsp. : intim și grupat						Gr. acop. : 10%	
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO						Volum :	
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Târlierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Paș	u.a.	Sup. (ha)	Gr. funcț.	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
21	102 B	7,39	II - PP	23112	Pășune	Versant	ondulată
Încl : 24 ^a		Exp : SE		Alt : 1365 - 1500 m		Unit.sol : sol humicosilicatic criptosodic	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Nardus stricta</i> - <i>Agrostis capillaris</i>						Acoperire ierbacee : 80%	
Gram : 68% (<i>Festuca rubra</i> 20%; <i>Nardus stricta</i> 13%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 10%; <i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Poa media</i> 5%; <i>Festuca ovina</i> 5%)							
Leg : 5% (<i>Trifolium sp.</i> 5%)							
Div. pl : 23% (<i>Plantago sp.</i> 2%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 5%; <i>Achillea millefolium</i> 2%; <i>Alchemilla vulgaris</i> 2%; <i>Urtica dioica</i> 2%; <i>Juncus effusus</i> 3%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Rumex alpinus</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 4% (<i>Veratrum album</i> 4%)							
Val. past : mijlocie						Arbuști. : <i>Juniperus communis</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>	
Răsp. : intim și grupat						Gr. acop. : 15%	
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp. :	
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO						Volum :	
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Combaterea vegetației lemnoase nevaloroase din pajiști. Combaterea altor buruieni din pajiști. Târlierea pajiștilor cu animale.							

Tr. Păș	u.a.	Sup (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
21	103 A	21,17	I - PS	23113	Pășune	Versant superior	ondulată
Încl : 38 ^g		Exp : SE		Alt : 1760 - 2180 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm : Bolovăniș, pietriș, stâncărie /0,2S							
Tip pajiște : <i>Festuca rubra</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Nardus stricta</i> Acoperire ierbacee : 70%							
Gram : 75% (<i>Festuca rubra</i> 20%; <i>Agrostis capillaris</i> 10%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 8%; <i>Poa violacea</i> 5%; <i>Nardus stricta</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 7%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 10%; <i>Poa media</i> 5%)							
Leg : 2% (<i>Trifolium sp.</i> 2%)							
Div. pl : 18% (<i>Carex sp.</i> 5%; <i>Luzula sp.</i> 3%; <i>Campanula sp.</i> 1%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%; <i>Plantago sp.</i> 4%; <i>Soldanella pusilla</i> 2%; <i>Campanula alpina</i> 1%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 5% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%; <i>Cetraria islandica</i> 2%)							
Val. past : mijlocie Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Rhododendron kotschy</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 15% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp: Volum :	
Date compl :							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							

Tr. Păș	u.a.	Sup (ha)	Gr. funcț	T.S.	Categ. folos.	Unit. rel.	Conf. teren
21	103 B	8,12	I - PC	23113	Pășune	Versant	ondulată
Încl : 32 ^g (30-38)		Exp : SE		Alt : 1620 - 1795 m		Unit.sol : podzol litic	
Date stat suplîm :							
Tip pajiște : <i>Nardus stricta</i> - <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> - <i>Festuca rubra</i> Acoperire ierbacee : 60%							
Gram : 76% (<i>Nardus stricta</i> 31%; <i>Festuca rubra</i> 10%; <i>Agrostis capillaris</i> 5%; <i>Agrostis rupestris</i> 5%; <i>Festuca ovina ssp. sudetica</i> 10%; <i>Anthoxantum odoratum</i> 5%; <i>Deschampsia caespitosa</i> 5%; <i>Poa violacea</i> 5%)							
Leg :							
Div. pl : 21% (<i>Campanula sp.</i> 2%; <i>Carex sp.</i> 10%; <i>Plantago sp.</i> 2%; <i>Potentilla erecta</i> 2%; <i>Luzula sp.</i> 2%; <i>Soldanella pusilla</i> 1%; <i>Pulsatilla alpina</i> 2%)							
Pl. dăunătoare + toxice : 3% (<i>Polytrichum juniperinum</i> 3%)							
Val. past : slabă Arbuști. : <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Rhododendron kotschy</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Alnus viridis</i> Gr. acop. : 65% Răsp. : întîm și grupat							
Veget. forest. :		Vârsta. :		Consist. :		Răsp: Volum :	
Date compl : Arbori izolați de MO; Pâlcuri de MO; Semințiș, nuieliș de MO							
Lucr.exec. :							
Lucr. prop. : Tărlirea pajiștilor cu animale.							



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
COMUNA HÂRSENI

Str. Principală, nr. 175, Tel. : (004) 0268/247800 ;fax : 0268/247832
cod fiscal 4384591, e-mail: comunaharseni@yahoo.com

NR 2103/11.04.2019

REFERAT
In atentia consiliului local
Amenajamentul pastoral

Avand in vedere adresa nr. 2103 din 08.04.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Harseni, Biroul agricol din cadrul Primariei comunei Harseni va pune in vedere urmatoarele aspecte:

Amenajamentul pastoral se raporteaza la supafata de **1532,03 ha pasunat comunal si alpin** sintetizat pe trupuri de pasune numerotate astfel: 1,2,3,4,5..... etc si denumirea aferenta pentru locatie.

- Sunt evidentiata durata, perioada de pasunat, capacitatea de pasunat, incarcatura de animale si productia de masa verde pentru fiecare trup de pasune.
- Sunt evidentiata lucrari de intretinere a pajistii pe fiecare trup de pasune.
- Fiecare trup de pasune are evidentiata urmatoarele date:

Categoria de folosinta

Unitatea de relief

Unitatea de sol

Tipul de pajiste

Gradul de acoperire

Valoarea pastorala

Lucrari propuse pentru intretinerea pasunii

Nu sunt evidentiata urmatoarele aspecte :

- Costurile pentru lucrarile propuse

Solutii tehnice si tehnologice care sa asigure realizarea scopurilor privind gospodaria rationala a fondului pastoral:

- lucrari preliminare pentru repunerea in valoare a pasunii
- metode de imbunatatire a covorului ierbos prin fertilizare
- amestecuri de ierburi pentru reinsamantarea sau suprainsamantarea pajistilor


-utilitatii zoopastorale(adaposturi pentru animale, surse de apa, drumuri de acces)

- organizarea pasunatului pentru diferite specii de animale
- corectarea reactiei extreme a solului pe pasuni
- repartizarea pasunilor pentru pasunat cu animale

Scopul final al punerii in practica a amenajamentelor pastorale consta in diminuarea sau inlaturarea procesului de degradare a pajistilor permanente printrun mod rational de gospodarire a fondului pastoral.

Urmare a celor prezentate mai sus Biroul agricol din cadrul Primariei Harseni solocita ca firma contractanta, respectiv SC CEMBRA FOREST SRL sa ia act de aspectele neevidentiate in extrasul de Amenajament Pastoral in vederea aprobarii de catre consiliul local.

La prezentul referat se anexeaza – Hotararea Consiliului Judetean privind pentru masa verde

Nr. Crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Intocmit ,consilier agricol	Sin Elena	11.04.2019	



CONSILIUL JUDEȚEAN
BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: +40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro



ROMÂNIA
1918-2018

Dirrecția Economică

Serviciul Buget

Nr. înregistrare:

1869 / 15.03.2019

JUD. BRAȘOV
COMUNA HÂRSENI
NR. 1581 DIN 19.03.2019


D-110 ST / PK

Către,

Dirrecția pentru Agricultură Județeană Brașov
Compartimentul Politici și Statistică Agricolă
Municipiul Brașov, str. Ecaterina Teodorescu nr. 38A, cod 500450

Vă transmitem alăturat, în copie, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 90/08.03.2019 privind modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019.

PREȘEDINTE,
Adrian-Ioan Veștea



SECRETAR,
Maria Dumbrăveanu

Vizat, Dir. Exec. Gabriela Agafitei 15.03.2019
Vizat, Șef Serv. Ildikó Sándor 15.03.2019
Întocmit, Enikő Both 15.03.2019



Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 90
din data de 8.03.2019

privind modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 8 martie 2019;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.1849/11.02.2019 întocmite de către Direcția Economică – Serviciul Buget, prin care se propune modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019, prevăzute la pozițiile nr. 9 și 16 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 471/20.12.2018;

Luând în considerare adresa nr. 631/04.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1849/04.02.201 a Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov, prin care solicită această modificare, ca urmare a unei erori de dactilografiere;

Având în vedere dispozițiile art.84, alin.(4), alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:


Art.1. - Se modifică pozițiile nr. 9 și 16 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 471/20.12.2018 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019, care vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Denumire produs	Preț mediu
9.	Fân natural	0,25 lei/kg
16	Iarbă	0,05 lei/kg

Art.2. - Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 471/20.12.2018 se modifică, conform art. 1 din prezenta hotărâre, și se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE
Adrian - Ioan Vestea



Contrasemnează,
SECRETAR
Maria Dămbăveanu






SECRETAR,
Maria Dumbrăveanu



Prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2019

Nr. crt.	Denumire produs	Preț mediu
1.	Grâu de toamnă	0,75 lei / kg
2.	Orz de toamnă	0,75 lei / kg
3.	Orzoaică de primăvară	0,80 lei / kg
4.	Ovăz	0,60 lei / kg
5.	Porumb boabe	0,60 lei / kg
6.	Cartofi (nesortați)	0,60 lei / kg
7.	Sfeclă de zahăr	0,12 lei / kg
8.	Sfeclă furajeră	0,06 lei / kg
9.	Fân natural	0,25 lei / kg
10.	Ceapă uscată	1,00 lei / kg
11.	Fasole boabe	8,00 lei / kg
12.	Tomate	2,00 lei / kg
13.	Morcov	1,50 lei / kg
14.	Varză	1,00 lei / kg
15.	Mere	2,00 lei / kg
16.	Iarbă	0,05 lei / kg

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Dir. Exec. Gabriela Agafiței



Vizat, Șef Serv. Buget Ildikó Sándor.....
Întocmit, Enikő Both

